

İSOSOL ALKOLLÜ ÇÖZELTİ®

KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN TİPİ (1) KULLANICI GRUBU: GENEL HALK

FORMÜLASYON ŞEKLİ (SIVI):

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) (Kimyasal adı; CAS Numarası) Povidon iyot % 10, CAS No;25655-41-8 Etil Alkol %30 CAS No;64-17-5
Yardımcı maddeler Poletilen glikol 400 ve Sodyum Lauril Sülfat içerir.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR: Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Escheria Coli

Geniş spektrumlu mikrobisid ve bakterisid etkisi olup gram (+) ve gram (-) bakterilere karşı etkilidir. Dezenfektan ve antiseptik olarak özellikle kontamine olmuş yaraların tedavisi ve cilt mukoza membranlarının antisepsisi için kullanılır.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ: Ameliyatlardan önce, jinekolojik ve doğuma yardımcı tedbirlerde, enjeksiyon, biopsi, punksiyon ve kan alma işlemlerinde cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır. Antiseptik yara tedavileri, yanma, pyodermi, mikotik ve bakteriyel menşeli yaralar, süper enfekte dermatozlar ile hijyenik ve cerrahi dezenfektanı olarak kullanılır.

Hızlı ve uzun süreli antisepsi sağlar. Acil durum antiseptiği olarak kullanılır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR: İyot alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır. Manifest hipertiroid durum gösteren özellikle dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda, hamilelik boyunca ve anne sütü alan çocuklarda dikkatli ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Radioterapi öncesinde ve civalı dezenfektanlarla kullanılmaz. Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER: İyoda duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.

İyodun aşırı absorpsiyonu metabolik asidoz, hipernatremi, renal fonksiyonlarda bozukluk ve gastrointestinal nekroz oluşturabilir.

Kullanım kılavuzunda yer almayan herhangi bir istenmeyen etki ile karşılaştığınızda doktorunuza ve eczacınıza başvurunuz.

Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 no'lu telefonunu arayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ / VARSA ANTİDOTU: LD50 değeri (oral,sıçan)18184 mg/kg (hesaplanan)

Antidotu: Nişastanın sudaki karışımı veya %1 lik Sodyum Tiyosülfat Çözeltisi.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Gözler: Gözü açarak 15 dakika bol su ile yıkayın. Doktor tavsiyesi alın.

Yutma: Temiz suyla ağız çalkalattırın. Bol miktar su için. Doktor tavsiyesi alın.

Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Tıbbi yardım alın.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER: Civalı dezenfektanlarla kullanılmaz.

KULLANIM ŞEKLİ : Doktor tarafından başka bir şey söylenmedikçe İSOSOL ALKOLLÜ ANTİSEPTİK ÇÖZELTİ® sulandırılmadan olduğu gibi deriye ve mukozaya sürülerek kuruması beklenir.

- Kullanmadan önce etiketi kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.
- Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Haricen Sulandırılmadan kullanılır.

İyot alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Radioterapi öncesi ve civalı dezenfektanlarla kullanılmaz.

Aşırı iyot absorpsiyonuna neden olabileceği için ileri derecede yanık veya derinin herhangi bir yolla tahrip olduğu geniş alanlarına uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Elektrokoter uygulamalarda içeriğindeki alkolün yanıcı özelliği nedeniyle kuruyana kadar işlem yapılmamalıdır.

İSOSOL ALKOLLÜ ÇÖZELTİ®

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R11- Kolay alevlenir.

R22- Yutulması halinde zararlıdır.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S2- Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun

S7/47- Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 °C'yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.

S16- Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.

S25- Göz ile temasından sakının.

S26- Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun

S46- Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

İSOSOL ALKOLLÜ ANTİSEPTİK ÇÖZELTİSİ®, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml'lik ambalajlarda bulunmaktadır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

25 °C' nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar kullanınız.

Ürünün 25 °C'nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 3 yıldır.

Sağlık Bakanlığı İzin Tarihi ve No: 24.10.2002-2011/594

İZİN SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ:

Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6 Pk: 34788

Taşdelen - Çekmeköy / İSTANBUL

www.merkezilac.com

Tel: (0216) 484 41 66 (Pbx) Fax: (0216) 484 41 91